

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT (S1)**  
**STIKES PAYUNG NEGERI PEKANBARU**

Skripsi, Agustus 2022

Tiara Oktarilla  
18401016

**Faktor Risiko Yang Mempengaruhi Kejadian Diare Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Sapta Taruna Kota Pekanbaru Tahun 2022**

**XV + 106 Halaman + 9 Tabel + 2 Skema + 6 Lampiran**

---

**ABSTRAK**

Diare adalah suatu keadaan dimana frekuensi buang air besar lebih dari 4 kali pada anak, konsistensinya cair, terdapat lendir atau darah pada tinja. Yang dimaksud dengan diare adalah hilangnya cairan dan elektrolit pada buang air besar dengan tinja yang encer atau cair. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor risiko yang mempengaruhi kejadian diare pada balita. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain *Cross Sectional*. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Sapta Taruna Kota Pekanbaru. Sampel penelitian berjumlah 85 responden. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki balita di Wilayah Kerja Puskesmas Sapta Taruna Kota Pekanbaru. Alat ukur penelitian ini adalah kuesioner. Analisis data menggunakan univariat dan bivariat dengan *chi square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada faktor yang mempengaruhi kejadian diare yaitu pemberian ASI eksklusif ( $P\text{ value} = 0,344 > 0,05$ ), pengetahuan ibu ( $P\text{ value} = 1.000 > 0,05$ ), dan sikap ibu ( $P\text{ value} 0,160 > 0,05$ ). Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ada faktor yang mempengaruhi kejadian diare. Disarankan bagi petugas kesehatan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Kata Kunci : Diare Balita, ASI Eksklusif, Pengetahuan Ibu, dan Sikap Ibu  
Daftar Pustaka : 24

**PUBLIC HEALTH STUDY PROGRAM (S1)**  
**STIKES PAYUNG NEGERI PEKANBARU**

Research, August 2022

Tiara Oktarilla  
18401016

**Risk Factors Affecting the Incidence of Diarrhea in Toddlers in the Working Area of the Pekanbaru City Sapta Taruna Health Center in 2022**

**XV+ 106 Pages + 9 Tables + 2 Schematics + 6 Attachments**

---

**ABSTRACT**

Diarrhea is a condition where the frequency of bowel movements is more than 4 times in children, the consistency is liquid, there is mucus or blood in the stool. What is meant by diarrhea is the loss of fluids and electrolytes in defecation with watery or liquid stools. The purpose of this research is to determine the risk factors that influence the incidence of diarrhea in children under five. This type of research is a quantitative study with a cross sectional design. This research was conducted in the working area of the Sapta Taruna Health Center, Pekanbaru City. The research sample is 85 respondents. The population in this study were all mothers who had toddlers in the working area of the Sapta Taruna Health Center, Pekanbaru City. The measuring instrument of this research is a questionnaire. Data analysis used univariate and bivariate with chi square. The results showed that there were no factors that influenced the incidence of diarrhea, namely exclusive breastfeeding ( $P\text{ value} = 0.344 > 0.05$ ), mother's knowledge ( $P\text{ value} = 1,000 > 0.05$ ), and mother's attitude ( $P\text{ value} 0.160 > 0.05$ ). ). The conclusion of this study is that there are no factors that influence the incidence of diarrhea. It is recommended for health workers to provide information and education to the public.

**Keywords** : toddler diarrhea, Exclusive Breastfeeding, Mother's Knowledge, and Mother's Attitude

**Bibliography** : 24