

**PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN
INSTITUT KESEHATAN PAYUNG NEGERI PEKANBARU**

Skripsi, Juni 2024

Mahadir
20301125

Efektifitas Terapi Suportif Terhadap Pasien Dengan Resiko Bunuh Diri Di Rsj
Tampan Provinsi Riau

Xii + 63 Halaman + 2 Skema + 15 Tabel + 1 Gambar + 14 Lampiran

ABSTRAK

Resiko bunuh diri adalah resiko untuk mengancam kehidupan yang disebabkan oleh luka, keracunan, atau mati lemas. Bunuh diri adalah agresi yang ditujukan kepada diri sendiri. Terapi suportif adalah pendekatan psikologis yang dirancang bagi individu atau kelompok untuk mengevaluasi diri mereka sendiri. Tujuan Penelitian adalah untuk Mengetahui efektifitas pemberian terapi suportif terhadap pasien dengan resiko bunuh diri di RSJ Tampan Provinsi Riau. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dengan desain quasy experiment dengan pendekatan one group pre and post test without control desain. tempat dilakukan di RSJ Tampan Provinsi Riau pada tanggal 10 s/d 13 juni 2024. Populasi yang di terapkan pada pasien dengan resiko bunuh diri dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 17 responden, teknik pengambilan sampel diambil secara consecutive sampling. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner Adult Suicidal Ideation Questionnaire (ASIQ) dengan SOP pemberian terapi suportif selama 40 menit dan dilakukan 4 kali pertemuan Hasil penelitian berdasarkan uji statistik wilcoxon didapatkan hasil nilai rata-rata resiko bunuh diri sebelum diberikan terapi suportif 21,20sedangkan nilai rata-rata resiko bunuh diri setelah diberikan terapi suportif 10,18 sebelum diberikan terapi suportif median (min-max) 23 (7-33) dan setelah diberikan terapi suportif median (min-max) 7 (5-23) nilai p value $0,000 > 0,005$ yang artinya pemberian terapi suportif ini efektif terhadap penurunan resiko bunuh diri di RS Jiwa Tampan Provinsi Riau. Diharapkan RS Jiwa Tampan Provinsu Riau dapat melanjutkan terapi suportif terhadap resiko bunuh diri yang ada di RS Jiwa Tampan Provinsi Riau.

Kata Kunci : Resiko bunuh diri, Terapi suportif
Daftar Pustaka : 48 (2016-2024)

**NURSING PROGRAM STUDY
NURSING FACULTY
INSTITUT OF HEALTH SCIENCES PAYUNG NEGERI PEKANBARU**

Research, Juny 2024

Mahadir
20301125

Effectiveness of Supportive Therapy for Patients at Risk of Suicide at the Tampan Hospital, Riau Province

Xii + 63 pages + 2 Schemes + 15 Tables + 14 Attachments

ABSTRACT

The risk of suicide is the risk of life-threatening actions caused by injury, poisoning, or suffocation. Suicide is aggression directed at oneself. Supportive therapy is a psychological approach designed for individuals or groups to evaluate themselves. The purpose of this study is to determine the effectiveness of providing supportive therapy to patients at risk of suicide at Tampan Mental Hospital in Riau Province. This research is quantitative, with a quasi-experimental design using a one-group pre-and post-test without control design. The study was conducted at Tampan Mental Hospital in Riau Province from June 10 to June 13, 2024. The population applied to patients at risk of suicide with a sample size of 17 respondents, using a consecutive sampling technique. The instrument used was the Adult Suicidal Ideation Questionnaire (ASIQ) with the SOP of providing supportive therapy for 40 minutes conducted in 4 sessions. The results of the study, based on the Wilcoxon statistical test, showed that the average suicide risk score before supportive therapy was 21.20, while the average suicide risk score after supportive therapy was 10.18. Before supportive therapy, the median (min-max) was 23 (7-33), and after supportive therapy, the median (min-max) was 7 (5-23). The p-value was $0.000 > 0.005$, indicating that the provision of supportive therapy is effective in reducing the risk of suicide at Tampan Mental Hospital in Riau Province. It is hoped that Tampan Mental Hospital in Riau Province can continue supportive therapy for suicide risk at Tampan Mental Hospital in Riau Province..

Keywords: Suicide risk, Supportive therapy

References: 48 (2016-2024)