

**PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS
KESEHATAN DAN INFORMATIKA
INSTITUT KESEHATAN PAYUNG NEGERI PEKANBARU
Penelitian Mei 2025**

Lisa Novera

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Risiko Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) pada Pegawai Kantor BPJS Kesehatan

viii + 61 Halaman + 9 Tabel + 9 Lampiran

ABSTRAK

Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi perhatian utama dalam bidang kesehatan masyarakat, terutama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan risiko kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) Pada Pegawai Kantor BPJS Kesehatan Cabang Dumai. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 54 orang. Sampel di pilih menggunakan metode sensus. Hasil penelitian menggunakan deskriptif analitik dan uji korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan seluruh responden yaitu sebanyak 54 orang (100,0%) masuk ke dalam kategori terdapat risiko ISPA. Hasil analisis juga menemukan ada hubungan antara kebiasaan merokok dan perilaku penggunaan masker dengan risiko kejadian ISPA. sedangkan hasil observasi menunjukkan bahwa kondisi lingkungan kerja yang kurang bersih *diduga kuat* berperan dalam tingginya risiko ISPA.

Kata Kunci : Risiko ISPA, Kebiasaan Merokok, Kebersihan Lingkungan Kerja, Penggunaan Masker

Daftar Pustaka : 30 (2017-2023)

***BACHELOR PROGRAM IN PUBLIC HEALTH
FACULTY OF HEALTH AND INFORMATICS
INSTITUT KESEHATAN PAYUNG NEGERI PEKANBARU
Research Conducted May 2025***

Lisa Novera

***Factors Associated with the Risk of Upper Respiratory Tract Infections (URTI)
among Employees of the BPJS Kesehatan Office***

viii+ 61 Pages + 9Tables + 9 Appendices

ABSTRACT

Upper Respiratory Tract Infections (URTI) are one of the major health concerns in public health, especially in Indonesia. This study aims to identify the factors associated with the risk of Upper Respiratory Tract Infections (URTI) among employees of the Dumai Branch of BPJS Kesehatan. The research employs a descriptive quantitative design with a sample size of 54 individuals. The samples were selected using a census method. The results were analyzed using descriptive statistics and Spearman's Rank correlation test. The findings indicate that all respondents, totaling 54 individuals (100.0%), fall into the category of being at risk for URTI. The analysis also reveals a relationship between smoking habits and mask usage behaviors with the risk of URTI. Meanwhile, observational results suggest that a less clean working environment is strongly suspected to contribute to the high risk of URTI.

Keywords: URTI Risk, Smoking Habits, Workplace Cleanliness, Mask Usage

References: 30 (2017–2023)