

**PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN
STIKES PAYUNG NEGERI PEKANBARU**

Karya Tulis Ilmiah, Juni 2022

Indriyanti Marsaulina Br. Nababan

Gambaran Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kejadian ISPA Pada Balita Di
Pusesmas Payung Sekaki

xiii + 59 halaman + 10 tabel + 5 gambar + 9 lampiran

ABSTRAK

Anak balita merupakan anak yang telah menginjak usia diatas satu tahun atau lebih populer dengan pengertian anak dibawah lima tahun. Saat usia balita, anak masih tergantung penuh pada orang tua untuk melakukan kegiatan penting, seperti mandi, buang air dan makan. Masalah yang di ambil yaitu “Apa sajakah Gambaran Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kejadian ISPA Pada Balita”. Faktor penyebab terjadinya ISPA pada balita ada 2 faktor yaitu faktor Instrinsik dan Ekstrinsik, Faktor instrinsik yaitu Status Gizi, Pemberian Kolostrum, Asi Eksklusif, Status Imunisasi, Kebiasaan Merokok , dan Ekstrinsik yaitu kepadatan penghuni dan Ventilasi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain deskriptif. Faktor penyebab terjadinya ISPA pada balita yang terbesar yaitu kebiasaan orang tua balita merokok sebanyak 39 balita dengan persentase 79,6 %, sedangkan yang tidak sebanyak 10 balita dengan persentase 20,4 %. Disarankan kepada orang tua balita termasuk ayah balita untuk tidak merokok di ruangan yang sama dengan balita.

Kata Kunci : Balita, ISPA, Status Gizi, Imunisasi, Asi eksklusif, Pemberian Kolostrum, Kebiasaan merokok, kepadatan hunian, dan Ventilasi.

Daftar Pustaka : 32 Referensi (2010-2019)

DIII NURSING STUDY PROGRAM
PEKANBARU STATE Umbrella Sticks

Scientific Writing, June 2022

Indriyanti Marsaulina Br. Nababan

Overview of the Factors Affecting the Incidence of ARI in Toddlers at the Payung
Sekaki Community Health Center

xiii + 59 pages + 10 tables + 5 pictures + 9 attachments

ABSTRACT

Toddlers are children who have reached the age of one year or more, popular with the understanding of children under five years. At the age of toddlers, children are still fully dependent on their parents to carry out important activities, such as bathing, urinating and eating. The problem that is taken is "What are the descriptions of the factors that influence the incidence of ARI in Toddlers". There are 2 factors that cause ARI in toddlers, namely intrinsic and extrinsic factors, intrinsic factors, namely nutritional status, giving colostrum, exclusive breastfeeding, immunization status, smoking habits, and extrinsic factors, namely population density and ventilation. The type of research used is quantitative research using a descriptive design. The biggest factor causing ARI in toddlers is the habit of parents of toddlers smoking as many as 39 toddlers with a percentage of 79.6%, while those who don't are as many as 10 toddlers with a percentage of 20.4%. It is recommended to parents of toddlers including fathers of toddlers not to smoke in the same room with toddlers.

Keywords :toddler,ARI, Nutritional Status, Immunization, Exclusive Breastfeeding, Giving Colostrum, Smoking Habit, Occupancy Density, and Ventilation.

Bibliography : 32 References (2010-2019)