

**PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
STIKES PAYUNG NEGERI PEKANBARU**

Skripsi, Agustus 2021

Kristina Sombo

Perbedaan Tingkat Kecemasan Pasien Pre Operasi dengan General Anestesi dan Regional Anestesi di Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru

xiii+57 Halaman+13 Tabel+9 Lampiran

ABSTRAK

Latar Belakang: Kecemasan pasien yang tidak terkontrol dirumah sakit menunjukan buruknya asuhan keperawatan yang dilakukan di rumah sakit. Kejadian pasien menunda dan membatalkan tindakan dengan alasan tidak siap secara mental berpengaruh pada *Length Of Stay (LOS)* pasien dirumah sakit. Hal ini menunjukan bahwa teknik manajemen kecemasan tidak diaplikasikan dengan baik. Perbedaan tingkat kecemasan yang terjadi pada pasien baik yang dilakukan tindakan dengan general anestesi dan regional anestesi membantu petugas kesehatan dalam melakukan manajemen kecemasan pada pasien pre operasi. Tujuan: Mengetahui Perbedaan Tingkat Kecemasan Pasien Pre Operasi dengan General Anestesi dan Regional Anestesi di Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru. Metode: Desain penelitian yang digunakan adalah desain komparatif. Sample yang digunakan sejumlah 52 sample dengan masing masing kelompok 26 sample yang diambil secara *purposive sampling*. Analisa data menggunakan uji *Mann-Whitney*. Hasil penelitian: Gambaran tingkat kecemasan pasien pre operasi RS Santa Maria Pekanbaru paling banyak sama-sama pada kategori “Cemas Berat” dimana pada general anestesi sebanyak 18 responden (69,2%) sedangkan pada kelompok regional sebanyak 15 responden (57,7%). Hasil uji data dengan *mann whitney* menunjukan nilai *p value* 0,462 yang berarti $p\text{ value} > \alpha 0,05$ sehingga H_0 di terima yang berarti tidak ada perbedaan tingkat kecemasan pasien pre operasi general anestesi dan regional anestesi di RS Santa Maria Pekanbaru.. Rekomendasi: Saran untuk peneliti selanjutnya perlu meneliti faktor yang berhubungan dengan kecemasan pre operasi.

Kata Kunci : Kecemasan, anestesi, regional dan general.
Daftar Bacaan : 26 (2011-2021)

PROGRAM STUDY OF NURSING
STIKES PAYUNG NEGERI PEKANBARU

Research , August 2021

Kristina Sombo

Differences in Anxiety Levels of Preoperative Patients with General Anesthesia and Regional Anesthesia at Santa Maria Hospital Pekanbaru

xiii+57 Pages+13 Tables+9 Appendices

ABSTRACT

Background: Anxiety of patients who are not controlled in the hospital shows the poor nursing care carried out in the hospital. The incidence of patients delaying and canceling actions on the grounds of being mentally unprepared has an effect on the Length Of Stay (LOS) of patients in the hospital. This shows that anxiety management techniques are not applied properly. The difference in the level of anxiety that occurs in patients who are treated with general anesthesia and regional anesthesia helps health workers in managing anxiety in preoperative patients. Objective: To determine the difference in the level of anxiety of preoperative patients with general anesthesia and regional anesthesia at Santa Maria Hospital Pekanbaru. Methods: The research design used is a comparative design. The sample used is 52 samples with each group of 26 samples taken by purposive sampling. Data analysis using Mann Whitney test. The results: The description of the anxiety level of preoperative patients at Santa Maria Hospital Pekanbaru is the same in the "Severe Anxiety" category where in general anesthesia there are 18 respondents (69.2%) while in the regional group there are 15 respondents (57.7%). . The results of the data test with Mann Whitney showed a p value of 0.462 which means p value > 0.05 so Ho is accepted which means there is no difference in the level of anxiety of patients with preoperative general anesthesia and regional anesthesia at Santa Maria Hospital Pekanbaru. Recommendations : Suggestions for further researchers need to examine factors related to preoperative anxiety.

Keywords: Anxiety, anesthesia, regional and general.

Reading List : 26 (2011-2021)